

令和2年9月30日まで

不活化ワクチン

ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、不活化ポリオ、2種混合(DT)、日本脳炎、子宮頸がん予防、インフルエンザ、高齢者肺炎球菌など

6日以上あけて

経口生ワクチン

ロタウイルス

注射生ワクチン

BCG、MR（麻しん・風しん）、水痘（水ぼうそう）、おたふくかぜなど

27日以上あけて

異なるワクチンを接種

令和2年10月1日から

☆令和2年10月1日から、異なるワクチン同士の接種間隔が緩和されました。

不活化ワクチン

ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、不活化ポリオ、2種混合(DT)、日本脳炎、子宮頸がん予防、インフルエンザ、高齢者肺炎球菌など

経口生ワクチン

ロタウイルスワクチン

制限なし

異なるワクチンを接種

注射生ワクチン

BCG、MR（麻しん・風しん）、水痘（水ぼうそう）、おたふくかぜなど

27日以上あけて

注射生ワクチンを接種

制限なし

不活化ワクチン、経口生ワクチンを接種

☆同じワクチンを複数回接種する場合

ワクチンごとに定められた接種間隔があります。⇒定期の予防接種の対象者と接種方法